## Description d'un Lucanide nouveau [Col.]

par H. Boileau.

**Metopodontus Poultoni**, n. sp. — Belle espèce, très voisine de *M. foveatus* Hope, mais facile à distinguer par l'armature des mandibules des mâles de forme majeure et par l'écartement des tubercules céphaliques.

♂ (Forme majeure). Tête aussi large que le prothorax ; angles antérieurs tronqués, anguleux extérieurement. Canthus presque linéaires, atteignant à peine la moitié des yeux. Ceux-ci sont saillants, fortement bombés, un peu plus développés en dessous. Joues presque parallèles, un peu renflées en arrière. Bord antérieur formé par deux arcs concaves aboutissant à l'épistome qui est trifide, comme chez *M. foveatus*.

La région frontale est fortement concave et se relève pour aboutir aux tubercules céphaliques. Ceux-ci, reliés par une nervure arrondie aux angles antérieurs de la tête, sont plus forts et deux fois plus écartés que chez *M. foveatus*. La fovéole qui les sépare et qui divise le bord frontal est plus large et mieux marquée, elle se prolonge aussi davantage en arrière.

Toute la surface est très régulièrement et très finement granuleuse à l'exception de la région frontale concave qui est, dans son entier, lisse et brillante. Chez *M. foveatus* cette région est granuleuse au voisinage des tubercules.

Mandibules longues, à peu près égales aux élytres et ressemblant beaucoup comme dimensions, forme et courbure à celles de *M. foveatus*. Elles diffèrent au contraire par leur armature interne. La dent principale, voisine du milieu, du *M. foveatus* est en effet absente et se trouve remplacée par un système de deux dents dont une, aigüe, voisine de la base, et l'autre, également simple, plus grêle, placée au delà du milieu et immédiatement avant les denticules apicaux. Ceux-ci sont normalement au nombre de quatre, coniques ou bifides, disposés comme chez *M. foveatus*, mais un peu plus espacés. Le dernier, voisin de la pointe des mandibules, est toujours plus petit, conique et simple. La pointe terminale est aiguë. L'ensemble de cette armature est très caractéristique, toutes les espèces immédiatement affines, telles que *M. foveatus*, *M. cinnamomeus*, *M. Dubernardi*, présentent en effet une seule dent principale médiane.

Antennes assez longues, fouet plus court que le scape ; peigne formé par les trois articles terminaux : le dernier a sa surface entièrement